



โรคไข้เลือดออก

Dengue Hemorrhagic Fever

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี”
การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน โดยมี ยุงลาย
เป็นพาหะนำโรค



อาการ




ไข้สูงเฉียบพลัน
เกิน 38 องศาเซลเซียส



ปวดศีรษะ



ปวดเมื่อยตามตัว
บางรายปวดไปถึงกระดูก



คลื่นไส้ อาเจียน
เบื่ออาหาร



มีจุดสีแดงขึ้น
ตามลำตัว



อาการเป็นเลือด
หรืออาการดำ

การรักษา



ดื่มน้ำให้มากๆ
พักผ่อนเยอะๆ



ยาลดไข้ควรใช้ “พาราเซตามอล”
ห้ามยาแอสไพริน



หากมีอาการปวดท้อง ชีमลง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลดตัวเย็น ผิดปกติ
รีบนำส่ง รพ.

การป้องกัน



หากมีอาการน่าสงสัยว่าเป็นไข้
เลือดออก ให้รีบไปพบแพทย์



ป้องกันยุงกัด นอนในมุ้งหรือ
ติดมุ้งลวดในบ้าน ทายากันยุง



ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง ใช้ทราย
กำจัดลูกน้ำและปรับภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด

มาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

5ป

1ข

ปิด ฝาภาชนะให้สนิท

ปล่อย ปลากินลูกน้ำ

เปลี่ยน น้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้

ปฏิบัติ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 7 วัน

ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไม่ให้ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ชัดใจ ยุงทิ้งน้ำที่ขังล้นบนพื้นดิน
เพื่อให้ไข่แห้งตาย